

妊婦さんの食生活

妊娠高血圧症候群の予防と食生活

[妊婦高血圧症候群の予防]

28週以降に起こりやすい病気です。早産になりやすく、未熟児の出生率も高くなります。自分で注意することで、十分防ぐことが出来ます。

◎予防

- ・うす味を心がけ・適正な体重を維持する。
- ・良質のたんぱく質（魚、肉、卵、大豆製品、牛乳など）を適量とる。

◎妊娠高血圧症候群の3大症状の・手、足、顔のむくみ・たんぱく尿・高血圧、いづれの症状があらわれたら、医師の診断を受け、食事に注意しましょう。

☆1日の塩分量は7.5g以内に！

甘塩鮭1切…0.7g	みそ汁1杯…1.0～2.2g
あじ干物1枚…1.4g	ラーメン1人前…6.0g
明太子1腹…3.4g	チャーハン1人前…2.6g
梅干し1個…2.2g	スパゲティミートソース1人前…2.8g
たくあん5切…0.6g	焼そば1人前…2.5g

女子栄養大学出版部
「FOOD & COOKING DATA 塩分早わかり」
および「毎日の食事のカロリーガイド」より

☆妊娠中から、うす味に慣れて

おくと、赤ちゃんの離乳食
作りもスムーズです。
また、夫や自分の生活習慣
病予防にも
つながります。



むくみは、ひどくならない
うちに診療を！

[体重のコントロール]

食欲にまかせて食べていくと、どんどん体重が増えて、肥満妊婦さんになってしまいます。
肥り過ぎに注意しましょう。

二人分食べるという意識はやめましょう。
体型をあらわす指標としてBMI（ボディマシンデックス）というのがあります。

妊娠前のBMIを確認してみましょう。

$$BMI = \frac{\text{体重(kg)}}{\text{身長(m)} \times \text{身長(m)}}$$

BMIがわかったら、表の体格区分から体重増加量を確認してみましょう。

☆肥満妊婦さんに起こりやすい異常

高血圧、妊娠高血圧症候群、糖尿病、心臓病、腎臓病、足、腰の筋肉痛、難産、出産後の母乳不足、など

体格区分（非妊娠時）	妊娠全期間を通しての推奨体重増加量		
	BMI値	妊娠中期から末期の1週間あたりの推奨体重増加量	
低体重（やせ）	18.5未満	9～12kg	0.3～0.5kg／週
ふつう	18.5以上 25.0未満	7～12kg	0.3～0.5kg／週
肥満	25.0以上	医師に相談	医師に相談

[たばこ・アルコールの害]

○たばこを吸うと、胎盤を通して、胎児への栄養補給が妨げられます。血液中の酸素が不足し、赤ちゃんの発育に影響します。

喫煙（副流煙を含む）の影響...

◆早産率が高くなる。◆自然流産率が高くなる。◆低体重児が生まれやすい。

○妊娠中の母親の飲酒が原因で種々の症候（胎児性アルコール症候群）が、引き起こされることがあります。注意しましょう。

妊産婦さんの1日にとりたい食品のめやす量

妊婦さんに必要な食品の目安量

群別	らはきた	食 品 群	非妊時	妊娠中期	妊娠末期	授乳期	
			めやす量	めやす量	めやす量	めやす量	
1 群	血や肉となる	肉類		肉 60g	肉 80g	肉 80g	肉 80g
		魚貝類		魚 1切れ	魚 1½切れ	魚 1½切れ	魚 1½切れ
		大豆 豆製品		豆腐1/4丁	豆腐1/4丁	豆腐1/4丁	豆腐1/4丁
		卵		卵 1個	卵 1個	卵 1個	卵 1個
2 群	骨の基となる	乳 乳製品		牛乳 200ml	牛乳 200ml	牛乳 200ml チーズ1切	牛乳 200ml チーズ1切
		海草類		海草 5g	海草 5g (ひじき)	海草 5g (ひじき)	海草 5g (ひじき)
		小魚		小魚 5g	小魚 10g	小魚 10g	小魚 10g
3 群	体の調子を整える	緑黄色 野菜		ほうれん草 人参 ピーマン等	150g	150 g	170 g
4 群		淡色野菜 きのこ		キャベツ たまねぎ 大根 キュウリ等	200g	200 g	200 g
	果物類			みかん りんご等	100g	みかん りんご等	150g
						みかん りんご等	150g
5 群	力や熱になる	穀類		ご飯3杯強 (1杯150g)	ご飯3杯強 (1杯150g)	ご飯4杯強 (1杯150g)	ご飯4杯強 (1杯150g)
		芋類		じゃがいも100g	じゃがいも100g	じゃがいも100g	じゃがいも100g
		砂糖類		砂糖20g (大さじ2杯)	砂糖20g (大さじ2杯)	砂糖20g (大さじ2杯)	砂糖20g (大さじ2杯)
6 群	油脂類			20g (大さじ1·1/2)	20g (大さじ1·1/2)	25g (大さじ2弱)	25g (大さじ2弱)

—— 栃木県栄養士会案 ——

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂 肪 (%)エネルギー比	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	VA (μgRE/日)	VB ₁ (mg)	VB ₂ (mg)	VC (mg)	葉酸 (μg)
非妊時 I	1700	50	20 ~ 30%	650	10.5	650	1.1	1.2	100	240
II	1950									
初 期	+ 50	+ 0	20 ~ 30%	+ 0	+ 2.5	+ 0	+ 0	+ 0	+ 10	+ 240
中 期	+ 250	+ 5	20 ~ 30%	+ 0	+ 15.0	+ 0	+ 0.1	+ 0.2	+ 10	+ 240
未 期	+ 450	+ 25	20 ~ 30%	+ 0	+ 15.0	+ 80	+ 0.2	+ 0.3	+ 10	+ 240
授 乳	+ 350	+ 20	20 ~ 30%	+ 0	+ 2.5	+ 450	+ 0.2	+ 0.4	+ 50	+ 100