

# 登園届

にのみや保育園 園長様

組

氏名

生年月日

年

月

日

(病名) 該当疾患にチェックをお願いします。

<input type="checkbox"/>	溶連菌感染症
<input type="checkbox"/>	マイコプラズマ肺炎
<input type="checkbox"/>	手足口病及びヘルパンギーナ
<input type="checkbox"/>	伝染性紅斑 (りんご病)
<input type="checkbox"/>	ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス・ロタウイルス等)
<input type="checkbox"/>	RSウイルス感染症
<input type="checkbox"/>	帯状疱疹
<input type="checkbox"/>	突発性発疹

<input type="checkbox"/>	伝染性軟属腫 (水いぼ)
<input type="checkbox"/>	伝染性膿痂疹 (とびひ)
<input type="checkbox"/>	頭ジラミ
<input type="checkbox"/>	アデノウイルス感染症

(医療機関名)

(令和 年 月 日受診)

において上記と診断されましたがその後、集団生活に支障がない状態と判断しましたので

令和 年 月 日より登園いたします。

令和 年 月 日

保護者氏名

印

(2) 医師の診断を受け、保護者の判断により登園届が必要な感染症

第三種感染症（その他）

病名	主要症状	感染期間	登園のめやす
溶連菌感染症	発熱・発疹・いちご状舌・のどの炎症・リンパ腺の腫れ	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後24～48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	咳・発熱・頭痛等、風邪の症状。特に咳は激しく、1ヶ月程度持続する	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手のひら、足の裏、口の中に、米粒のような発疹。口の中では、舌・唇の内側・頬の内側などにでき、食欲低下する	手足や口腔内に水疱・潰瘍かいようが発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑 (りんご病)	頬、腕、下肢にレース様の発疹	発疹出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノ等)	水様下痢、嘔吐、発熱、気道症状	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	突然の高熱、咽頭痛、口腔内に特徴的な発疹	急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	発熱、鼻汁、喘鳴、呼吸困難。乳児期早期では細気管支炎・肺炎による入院の場合がある	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	小水疱が現れ神経痛、刺激感を訴える。痒みを訴える場合がある	水疱を形成している間	すべての発疹が痂皮(かさぶた)化してから
伝染性膿痂疹 (とびひ)	湿疹や虫さされ痕部に細菌感染を起こし、びらんや水疱病変を形成。掻痒感を伴う	効果的治療開始後24時間	皮疹が乾燥するか、患部が被覆できる程度になること
伝染性軟疣腫 (水いぼ)	直径1～3mmの半球状丘疹。四肢、体幹等に数個～数十個むらがって見られる	効果的治療開始後、24時間	掻きこわし傷から液が出ない状況
アタマジラミ	無症状又は、掻痒感(かゆみ)	産卵から最初の若虫が孵化する10～14日間	駆除を開始していること
突発性発疹	38℃以上の高熱が3～4間続いた後、体幹部中心に鮮紅色の発疹が出現	—	解熱しきげんが良く全身状態が良いこと

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症について（一）としている。